

# **Manažment pacientov so seminómom testis v I. klinickom štádiu**

**Dalibor Ondruš, Martina Ondrušová, Vanda Ušáková**

**Prospektívna štúdia: 4/2008-4/2016**

**Cieľ: porovnanie prísneho dohľadu versus adjuvantná chemoterapia u celkovo 125 pacientov so seminómom testis v I. klinickom štádiu.**

**Stratifikácia podľa rizikových faktorov do dvoch skupín:**

**A skupina (nízke riziko): 95 pacientov - taktika prísneho dohľadu**

**Relaps ochorenia u 9 (9,47%) pacientov po 13,6 mesiacoch sledovania**

**B skupina (vysoké riziko):**

**prítomnosť infiltrácie rete testis, pT  $\geq$  2, objem primárneho nádoru  $>$  4 cm.**

**30 pacientov – adjuvantná chemoterapia (1 cyklus karboplatiny)**

**Relaps ochorenia u dvoch (6,67%) pacientov po 13,8 mesiacoch sledovania.**

**Rozdiely v prežívaní bez progresie (DFS) a v celkovom prežívaní (OS) nie sú štatisticky významné.**

**Adjuvantná chemoterapia – adekvátny postup u pacientov so  $\uparrow$  rizikom relapsu**

**Taktika prísneho dohľadu u pacientov bez rizikových faktorov.**

**Optimálny manažment pacientov so seminómom testis v I. klinickom štádiu nad'alej kontroverzný.**

**Medzinárodné guidelines pripúšťajú viaceré alternatívy liečby,**

**avšak jednoznačný ústup od adjuvantnej rádioterapie**

**(zvýšené riziko neskorej toxicity, najmä sekundárnych malignít)**