

Výsledky vazo-vazoanastomózy u pacientov po vazektómii

Chocholatý M¹, Čechová M², Babjuk M², Hanek P³

¹Urologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín

²Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha

³Urologické oddelenie, Oblastní nemocnice Příbram

Ciel' práce: Zhodnotiť úspešnosť vazo-vazoanastomózy po vazektómii.

Metódy: V rokoch 2013-2015 sme realizovali vazo-vazoanastomózu u troch pacientov po vazektómii. Priemerný vek pacientov bol 35 rokov (25 až 42 rokov), priemerná doba od vasektómie bola 5 rokov (4 až 6 rokov).

Výsledky: Spermioqram sme analyzovali 3 mesiace od vazektómie. U jedného pacienta bola prítomná normospermia, u druhého pacienta oligoastenospermia a po 6 mesiacoch od výkonu normospermia. Tretí pacient mal azoospermiu, zároveň sme zistili i nízku hodnotu testosteronu 7,93 mmol/l. Po nasadení klomifen citrátu 25mg denne bola za 6 mesiacov koncentrácia 0,02 miliónov/ml spermíí a za ďalšie 3 mesiace 0,7 miliónov/ml spermíí.

Záver: Vazo-vazoanastomóza je efektívna metóda v riešení fertility u pacientov po vazektómii. V prípade pretrvávajúcej azoospermie po vazo-vazoanastomóze je dôležité i pátrať po ďalších príčinách infertility.

